



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9020

無秘<sup>®</sup>栓劑

**Bisacodyl<sup>®</sup> 10 mg**



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 無秘<sup>®</sup>栓劑 (Bisacodyl<sup>®</sup> 10 mg)

2008 11 修訂

藥品成分名：Bisacodyl

藥品外觀：白色，長條形，肛門塞劑。

## 作用

無秘<sup>®</sup>栓劑為緩瀉作用，便秘短期治療；手術或檢查前淨腸。

## 用法

- 1.請確實遵照醫生或藥師的指示使用藥物。
- 2.通常在解便前使用，15到60分鐘會產生藥效。
- 3.栓劑使用流程：  
撕掉外包裝，用食指輕按栓劑之底部，再插入肛門內。

## 注意事項

- 1.若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
- 2.本藥品限使用於肛門，若藥品過軟時，請置於低溫待較硬後再使用。
- 3.不建議長期使用，一旦排便順暢，即應停藥。
- 4.若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

5.如廁時請小心以防跌倒、滑倒。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了用藥時，請盡速補足。
2. 若已經很接近下一次用藥時間，只需使用下次藥物，不可一次使用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形請不用驚慌：腸道過度活動如、腹絞痛、腹痛、打嗝、噁心或電解質失衡等。
2. 若有過敏反應，如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等，請立即停藥並就醫。

### 保存方法

1. 儲存於陰涼乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄，一般效期為開立後三個月內。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

### 預防藥物造成跌倒

- ★ 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。

★ 預防方式：

1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

