



臺北醫學大學附設醫院  
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9002

帝舒滿<sup>®</sup> 定量噴霧吸入器  
Duasma<sup>®</sup> MDI



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 帝舒滿<sup>®</sup> 定量噴霧吸入器 (Duasma<sup>®</sup> MDI)

2009.07 修訂

藥品成分名：Budesonide 200mcg/噴，每瓶 200 噴。

## 作用

可減少氣管發炎，能夠有效的降低呼吸道過度反應之現象

## 用法

1. 將噴霧器出口蓋子移除



2. 將吸入器輔助器開口較寬的一邊與噴霧器出口連接



3. 上下搖動噴霧器(瓶底感到冰涼即可)，同時確定上述連接處是否緊密



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4.  
吸入前先呼一口氣



5.  
將吸嘴含於兩唇間，按壓  
一次吸入器，同時慢慢持  
續深吸氣至少 3-5 秒  
(請盡量於按壓時同時吸  
氣以確保藥效)



6.  
然後閉氣 5-10 秒，再慢慢  
吐氣



閉氣

### 注意事項

1. 請在每次使用完後漱口，因為藉由漱口能有效降低聲音嘶啞及鵝口瘡等副作用的發生。
2. 若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔 1-2 分鐘，再吸入下一個劑量。

## 如何清潔？

至少一星期清理吸入器一次。將吸入器(塑膠外殼)與藥罐(金屬罐)分開，吸入器可以水沖洗，洗完後直接晾乾即可，避免置於溫度過高的地方(如日曬處)，且不須以吹風機吹乾。藥罐不可放入水中。

