



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9021

意福<sup>®</sup> 灌腸液

EVAC<sup>®</sup>



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 意福<sup>®</sup>灌腸液 (EVAC<sup>®</sup>)

2008 11 修訂

藥品成分組成：EVAC enema 每 ml 含

Monosodium Phosphate anhydrous 139.1 mg

Disodium Phosphate anhydrous 31.8 mg

## 作用

用於便秘之緩解，大腸檢查前內容物之排空，腹部手術前之緩下劑。

## 用法

1. 本藥劑需經醫生指示使用，成人每次一瓶，2 至 12 歲兒童半量使用。
2. 使用時請溫和並緩慢將灌腸器的頂端塞入肛門內，並緩慢的向前推至頂到瓶口為止，然後再以手將藥液完全灌入為止。

## 注意事項

1. 若有腹痛、噁心、或嘔吐現象，請勿使用任何瀉藥。
2. 經常使用本劑可能會發生習慣依賴。
3. 患有先天性巨結腸症、充血性心臟病等不可使用本藥劑。
4. 患有腎功能不全、心臟病，或體內電解質不平衡，

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

或正在服用鈣離子阻斷劑、利尿劑或其他會干擾體內電解質平衡之藥物，須小心使用本劑。

5.如廁時請小心以防跌倒、滑倒。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了使用藥品時，請盡速使用。
2. 若已經很接近下一次用藥時間，請跳過這一次，到下次用藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

若使用後造成不舒服或腸胃道出血，請立即停藥並就醫！。

### 保存方法

1. 儲存於室溫、陰涼乾燥處及避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。

### 預防藥物造成跌倒

★ 使用峻瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌到，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。

★ 預防方式：

1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

