

賜爾克痛[®](Salcoat[®])與口腔用小型噴霧器 (Puvlizer[®])之使用方法

9018

2007.03 修訂

藥品成分名：Baclomethason dipropionate

藥品外觀：藍白膠囊，配合專用之小型噴霧器(Puvlizer[®])

作用

賜爾克痛[®]是一個用於減輕口內炎（口腔黏膜糜爛、潰瘍）引起的不適症狀（疼痛、咀嚼困難、口臭、味覺異常等現象）的藥品。

用法

本劑為藍白膠囊，配合專用之小型噴霧器(Puvlizer[®])，將膠囊內之粉末直接噴霧入口腔內。1次1顆膠囊以專用噴霧器噴在患部，一天2-3次。

使用方法

1. 請用肥皂及清水充分清潔雙手並擦乾。
2. 自鋁箔片中取出膠囊。將噴霧器大蓋子打開後另有一小蓋(需旋轉拿開)，將膠囊置於小蓋內，再小蓋(含膠囊)旋緊回噴霧器本體上。
3. 將噴霧器大蓋子蓋回噴霧器上，此時，大蓋子內的針會刺穿膠囊。
4. 再一次將大蓋子打開，即可準備進行噴霧。
5. 噴霧器尖端請勿碰觸到口腔，以免被唾液沾濕。
6. 噴完後請將膠囊取出丟棄之。
7. 用內附的小刷子清理噴霧器上殘留的粉末。
8. 橡皮球請勿水洗。

注意事項

1. 賜爾克痛[®]是噴於口腔黏膜吸附性粉末(外用劑)，請勿將膠囊內服或當鼻噴吸入劑使用。
2. 使用時，請以專用的小型噴霧器對準口腔患部，暫時停止呼吸，再噴霧給藥。
3. 放在乾燥處，避光儲存。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您