



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

9007

吸必擴[®]都保乾粉吸入器
Symbicort[®] Turbuhaler



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

吸必擴[®]都保乾粉吸入器 (Symbicort[®] Turbuhaler)

2009.07 修訂

藥品成分名：Budensonide160mcg/ Formoterol 4.5mcg
每瓶可使用 120 次。

作用

可減少氣管發炎並使支氣管擴張，治療可逆性呼吸道阻塞

用法

1.

旋轉並移去瓶蓋



2.

一手將吸入瓶直立，另一手控制底盤先向右旋轉到底後再向左旋轉到底，聽到”喀擦”一聲，即充填好一次劑量



3.

吸入前先呼一口氣



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4.

將吸嘴含於兩唇之間，快速
深深的吸一口氣



5.

深吸氣到底後盡可能閉氣
5-10 秒，然後將氣慢慢吐出



閉氣



6.

將瓶蓋歸位並旋緊



注意事項

1. 使用完畢後務必漱口。
2. 若需吸入第二個劑量時，請在第一次吸入動作完成後隔 1-2 分鐘，再吸入下一個劑量。
3. 因為所投予的粉末相當微量，您僅需依照前述方式使用，應可確保藥品已被吸入。

如何知道藥品存量？

當視窗出現第一格紅色時表示剩下 20 次劑量，若視窗全部為紅色時，表示藥品已用完。



如何清潔？

將吸入器的頭部與體部分開，以乾布擦拭或輕敲桌面使殘餘粉末掉落。切記！絕對不可以水清潔。

