


2007.02 修訂

## 使用方法

1. 用肥皂及清水充分清潔雙手。
2. 打開軟膏管蓋子，將送藥器旋轉至軟管上。
3. 送藥器鎖到底時，擠壓軟膏管且填充軟膏量到送藥器中。
4. 將送藥器自軟膏管旋轉移除。
5. 仰臥彎曲雙腿，輕輕的將送藥器插入陰道，而深度要能順利插入即可。輕輕的壓送藥器以使藥膏推送入陰道後，將送藥器從陰道取出。
6. 軟膏管上蓋保存

## 注意事項

1. 避免性交，以免再感染。
2. 使用保險套，以免再感染。
3. 非醫師指示，懷孕或哺乳婦女請不要使用。
4. 若使用後病情惡化或癢、刺激感時，應立即就醫。
5. 一般在睡前或醫師指示時間使用。
6. 陰道栓劑應防潮，保存在小孩不易拿到及陰涼處。
7. 栓劑變軟無法塞入時，可將栓劑放置冰箱冷藏約 30 分或除去外包裝前置於冷水使其變硬。



此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您