

鼻噴劑使用方法及注意事項

9016

2007.03 修訂

使用方法

(一) 第一次用藥

充分搖動藥瓶並對空噴壓藥劑數次(3-5次)，並觀察噴出為均勻霧狀。



(二) 平常用藥

1. 擤鼻 (清理鼻腔)。
2. 搖動藥瓶、移開瓶蓋。
3. 一手正確握住藥瓶，一手食指壓住一邊鼻孔，將噴頭插入鼻孔，頭梢向前傾，用手按壓噴瓶，使之噴出指定劑量的氣霧。
4. 用鼻輕輕呼氣；如須第二噴，請重複步驟3，噴入第二噴鼻噴劑。
5. 換手，並在另一邊鼻孔重複整個程序。
(Miacalcic 密鈣息[®]鼻噴劑只噴一側)



(三) 用藥後

用乾淨的紙巾或手帕將鼻噴劑噴嘴擦拭乾淨，蓋回蓋子。

注意事項

1. 不要用水清洗藥品噴口，用衛生紙擦乾淨即可。
2. 若病情持續或更嚴重、給藥後鼻腔搔癢或燒灼感時，應立即就醫。
3. 藥品不需冷藏，除非有特別指示。
4. 藥品變色不可使用。
5. 藥品瓶蓋要緊閉、置陰涼處保存。
6. 勿將個人的藥物提供給他人使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您