



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0040

乙醯胺基硫唑嘧[®]錠
Acetazolamide[®] 250 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

乙醯胺基硫唑嘧[®]錠

(Acetazolamide[®] 250 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Acetazolamide

藥品外觀：白色，圓形，錠劑；大小：0.95 公分；

標記：[401]

作用

乙醯胺基硫唑嘧[®]錠為口服的利尿劑，以控制您的血壓接近正常值。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
3. 懷孕婦女禁止使用壓作[®]錠。
4. 此藥可能使血糖升高，因此患有糖尿病的人，應該注意血糖狀況。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：噁心嘔吐、感覺異常、食慾不振、嗜睡、倦怠感。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：耳鳴、排尿困難、四肢鈍重感、視覺模糊、眼睛或皮膚變黃、抽筋等情形，請立即就醫！
3. 服用壓作[®]錠可能會增加病患如廁的頻率，由病床至如廁的整個過程容易跌倒，須小心注意。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。