



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0134



癌伏妥[®]錠

Afinitor[®] 5mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

癌伏妥[®] 錠 (Afinitor[®] 5mg)

2011.03 修訂

藥品成分名：Everolimus

藥品外觀：白色，長柱形，錠劑；標記：[5][NVR]

作用

癌伏妥為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。一般主用於腎細胞癌。

服用指示

1. 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
2. 可隨餐服用，亦可空腹服用；若出現胃部不適可與食物併服。
3. 藥錠不可咀嚼或咬碎。

注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 有肝臟、腎臟疾病，或有糖尿病以及高血脂，應告知您的醫（藥）師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 盡量避免或減少含酒精性飲料的攝取，避免飲用大量葡萄柚汁，以免影響藥品的代謝及療效。
5. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
6. 若您有服用以下藥物，如：Ketoconazole、Erythromycin、Verapamil、Rifampicin 等等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
7. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成口角炎，請注意口腔衛生並避免使用含酒精等較為刺激的漱口水。
2. 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心避免受傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。
3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、落髮、頭痛、口乾、手腳疼痛、水腫、舌頭麻、味覺改變。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。