



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

### 藥品使用指導單

0125



安閣靈<sup>®</sup> 膠囊

Agrylin<sup>®</sup> 0.5mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 安閣靈<sup>®</sup>膠囊 (Agrylin<sup>®</sup> 0.5mg)

2010.12 修訂

藥品成分名：Anagrelide hydrochloride

藥品外觀：白色，長圓柱形，硬膠囊；大小：4 號；

標記：[特殊標記] [063]

## 作用

為一種治療血小板過多的藥品，能影響體內生成血小板的巨核細胞，減少血小板數量。目前用於治療原發性血小板過多症。

## 用法

此藥每天服用一次，飯後使用，請依照醫師指示的時間服用。

## 注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 若您有心血管疾病、腎功能或肝功能不良，請告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。

4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、便秘、腹瀉、胃痛、虛弱、疲倦、頭暈、頭痛、失眠、皮膚乾癢、脫水。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重腹瀉、手或腳紅腫、麻木或疼痛、發燒、寒顫、喉嚨痛、胸痛、發疹、食慾降低、嚴重嘔吐等。

### 保存方法

1. 此藥請密封，放在陰涼處避免日光照射。

2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

