



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0019



胺非林[®]錠
Aminophylline[®] 100 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

胺非林[®]錠 (Aminophylline[®] 100 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Aminophylline

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.90 公分；
標記：[U，L][049]

作用

胺非林[®]錠為支氣管擴張劑，可用來解除因氣喘或其他肺部疾病引起的呼吸困難。

用法

1. 胺非林[®]錠必須維持血中濃度以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 胺非林[®]錠可空腹或飯後服用，但請每天以相同方式服藥。

注意事項

1. 對胺非林[®]錠或茶鹼類藥物過敏，請勿使用此藥。
2. 胺非林[®]錠和許多藥都有可能產生交互作用，請務必告知醫師所有您正在服用的藥品，包括成藥、維他命、中草藥等。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳、有心、肺、肝、腎、甲狀腺機能亢進、消化性潰瘍或癲癇等方面的疾病，請先告知您的醫師。
4. 喝茶、咖啡、可樂及抽菸將影響藥品的作用；如果您平日有喝茶或咖啡的習慣，請告知您的醫師，因為可能需要調整劑量。
5. 請按時回診，因為醫生可能需要監測您的血中藥物濃度與評估治療效果。
6. 若有需要就診，請告知他科醫師或牙醫您正服用此藥。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用

症狀	如何處理
噁心、嘔吐、胃痛、腹痛、食慾差	隨餐或飯後馬上服用，或與制酸劑併用，若症狀持續未改善，請與醫師聯繫

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

頭痛、精神不安、急躁、 暈眩、頻尿、頭及手指 肌肉抽筋	若症狀持續或嚴重時， 請與醫師聯繫
失眠、心跳快速、心悸、 呼吸急促	您的劑量可能需要調 整，請與醫師聯繫
異常行為、心悸、心律 異常、微燒、呼吸急促、 出汗、極度口渴、耳鳴、 肌肉抽筋、經常嘔吐(嘔 吐物為咖啡色)	請立即與醫師聯繫
皮膚起疹、皮屑、水泡	請立即與醫師聯繫

保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
避免放在孩童可以取得的場所。
2. 請勿讓他人服用您的藥品。