



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0126



安得卡[®]錠

Androcur[®] 50mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

安得卡[®]錠 (Androcur[®] 50mg)

2011.01 修訂

藥品成分名：Cyproterone acetate

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.9 公分；

標記：[BV]

作用

男性：為一種治療前列腺腫瘤的藥品，能拮抗體內雄性素。

女性：可使用於嚴重的男性化症狀、青春痘，以及多毛症。

用法

此藥因為有許多適應症，請依照醫師指示的時間和方式服用。

注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 若您有心血管疾病、腎功能或肝功能不良，請告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥會傷害胎

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。

4. 若您有糖尿病，因為本品有造成血管栓塞的風險，請盡量讓醫（藥）師了解您的病情。
5. 服用藥品期間，會造成疲倦、體力衰退以及降低專注力，有開車及操作機械者請注意。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：噁心及嘔吐、便秘、腹瀉、胃痛、虛弱、疲倦、頭暈、頭痛、失眠、皮膚乾癢、脫水。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 下述症狀若有持續或加重：疲勞、喉嚨或口腔內疼痛，請告知您的醫師。
3. 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重腹瀉、手或腳紅腫、麻木或疼痛、發燒、寒顫、喉嚨痛、胸痛、發

疹、食慾降低、嚴重嘔吐等。

保存方法

1. 此藥請密封，放在陰涼處避免日光照射。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

