



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0035

安鬱[®]腸溶錠

Anwu[®] 50 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

安鬱[®]腸溶錠(Anwu[®] 50 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Fluvoxamine maleate

藥品外觀：明黃澄色，圓扁形，錠劑；

大小：0.80 公分；標記：[ST][387]

作用

安鬱[®]腸溶錠是用來調整情緒或治療強迫症。

用法

1. 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。
2. 建議在晚上服用
3. 將藥物與水吞服，請勿咬碎。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 服藥期間請勿飲酒。
3. 服用藥物可能造成視力模糊、嗜睡，請避免操作機械及開車。
4. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用太過擔心：腸胃不適、便秘、口乾、視力模糊、嗜睡。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。