



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0038



諾曼癌素[®]糖衣錠
Aromasin[®] 25mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

諾曼癌素®糖衣錠 (Aromasin® 25mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Exemestane 25mg

藥品外觀：白色，原形，錠劑；大小 0.6 公分

標記；[7663]

作用

乳癌輔助治療藥品，並預防復發。

用法

1. 請遵照醫師指示服用，勿任意更改劑量或停藥。
2. 一般為每天服用一錠，含有脂肪的食物可增加藥品的吸收，建議飯後服用。

注意事項

1. 不適用於停經前婦女。
2. 有肝、腎、心臟疾病或骨質疏鬆，應告知您的醫生及藥師。

可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿過於緊張：臉熱潮紅、噁心、疲勞、口水增加、食慾增加、水腫、抑鬱。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 若有下述症狀，請告知您的醫師：頭暈、頭痛、疲倦、虛弱、落髮；肌肉、關節或骨頭痠痛；食慾不振、失眠。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。