

安定文®錠 Ativan® 0.5mg

安心平®注射劑 Anxicam® (Ativan) 2mg/Amp

藥品成分名：Lorazepam

藥品外觀：

1.口服

淺藍，圓扁形，錠劑；大小：0.5 公分；標記：[0.5]

2.針劑

棕色玻璃，澄清液體；字體為黃色

作用

是一種苯二酚(Benzodiazepine)類的藥物，可用於治療焦慮；注射劑型也可用在癲癇發作、改善化療後的噁心及嘔吐、讓麻醉劑的效果更好。

用法

1. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
2. 注射劑型由專業的醫療人員注射給予。

注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若需要進行其他手術或牙科處置時，請先行告知醫生。

3. 使用此藥品前請勿喝含酒精性的飲料或使用其他中樞神經抑制劑。
4. 使用此藥品後請勿開車或操縱精密的儀器，並小心走路預防可能發生的跌倒。
5. 在手術前需告訴醫生或藥師是否有其他並存的疾病(例如：中風、憂鬱症、心臟疾病、青光眼、肝腎疾病、肺部及呼吸道的疾病、帕金森氏症、癲癇、重症肌無力等等)。
6. 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
7. 若有計劃懷孕(或是已經懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。
8. 對苯二酚(Benzodiazepine)類過敏者須在使用前告知醫生。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶等；以上副作用通常只會出現在治療初期，繼續服用後通常副作用都會漸漸消失。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：憂鬱、睡眠障礙、激動、心跳加快、眼睛變黃、講話困難、無法控制肌肉等，請立即就醫！

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 注射劑型請儲存至冰箱冷藏。
5. 勿將您的藥物提供給他人使用。