



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0004

倍利脂[®] 緩釋錠
Bezalip[®] 400 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

倍利脂緩釋錠[®] (Bezalip[®] 400 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Bezafibrate

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：1.0 公分；

標記：[BM][D9]

作用

倍利脂[®]緩釋錠用來降低血中過高的膽固醇，以預防心血管疾病、及中風的發作。

用法

依照醫師指示，每天早晨或晚上隨餐或餐後以足量開水吞服一錠。

服注意事項

如果有下列情形請先知會您的醫(藥)師：

1. 曾對本藥或類似藥物過敏。
2. 正在懷孕或哺乳，或計畫懷孕者。
3. 正在服用其他藥物或健康食品者。
4. 有肝腎疾病、膽囊疾病病史者。
5. 有大量飲酒習慣的人。
6. 若您有正在服用下列的藥品，請告知您的醫師或藥師：
A. 抗凝血劑：Warfarin。
B. 糖尿病藥：insulin、sulphonylurea。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

C. MAO 抑制劑類抗憂鬱藥：phenelzine。

7.不可自行停藥，按照醫師的指示，注意食物的攝取應該減少脂肪，適度運動。

忘記服藥時該怎麼辦？

- 1.若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 2.若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 3.切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：噁心、胃部脹氣、沒胃口、頭痛、暈眩和失眠。這些症狀會隨時間慢慢減弱。

若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛或不尋常的虛弱感或痙攣、皮膚出現黃疸現象、下背部疼痛、上腹部劇烈疼痛、肝或腎功能檢查異常。

症狀	如何處理
頭暈	通常發生在剛開始服藥或改變劑量時，若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

動作無法控制(常發生在嘴唇、舌頭、四肢)、心跳過快、發燒、盜汗、意識混淆、癲癇發作、肌肉僵直、視覺模糊有光暈、吞嚥困難、困倦

請立即與醫師聯繫

保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

飲食原則：

攝取低膽固醇，低脂肪含量的食物。

1. 應多攝取：

蔬菜水果、脫脂牛奶、魚類、蛋白。

2. 應該避免攝取：

蛋黃、全脂牛奶、花生醬、巧克力、奶油、蛋糕、餅乾、椰子油、起士、洋芋片、棕欖油、以及油炸類食物。