



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0042



普治使可<sup>®</sup>錠  
Butyscol<sup>®</sup> 10mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 普治使可<sup>®</sup>錠(Butyscol<sup>®</sup> 10mg)

藥品成分名：Hyoscine-N-butylbromide

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.7 公分

## 作用

普治使可<sup>®</sup>錠用於緩解平滑肌之痙攣，膽石症及膽囊炎發生之痙攣；輸尿管之痙攣。

## 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

## 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 前列腺肥大、閉尿、幽門狹窄者請勿投與此藥。
3. 此藥物可能發生視力模糊的副作用，患者避免從事需精神集中或視力敏銳之工作，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，

請特別注意。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：口乾、食慾不振、頭痛、心悸亢進。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

### 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。