



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0044



癩舒液[®]
Carbatol[®] 20 mg /ml*100ml



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

癲舒液[®] (Carbatol[®] 20 mg/ml)

2007.02 修訂

藥品成分名：Carbamazepin

藥品外觀：液劑。

作用

癲舒液[®]為口服的抗癲癇藥物，主要治療癲癇症、三叉神經痛、腎原性尿崩症、雙極性疾患，以控制您的癲癇發作情況。

用法

1. 搖勻後使用。
2. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
3. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

注意事項

1. 為口服懸浮液，可由藥師處取得量杯，以方便量取正確的藥量，且使用前要搖勻。請勿與其他液體藥品同時混合服用。
2. 長期使用，應定期檢查肝功能和血液血球數量。
3. 為了避免對胃部的刺激，此藥最好與食物或在飯後服用。

忘記服藥怎麼辦？

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：出疹、腸胃不適、運動失調、暈眩、疲倦。
2. 服用癲舒液[®]可能造成注意力不集中容易跌倒請小心。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。