



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0046



可蘇多[®]錠
Casodex[®] 50 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

可蘇多[®]錠 (Casodex[®] 50mg)

2009.12 修訂

藥品成分名： Bicalutamide

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.65 公分；
標記：[Cdx，50][特殊標記]

作用

前列腺癌的輔助用藥。

用法

1. 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 一般使用劑量：每天一次，每次一錠，於固定時間服用。

注意事項

1. 有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 藥品可能影響肝功能，如有下列症狀：噁心、嘔吐、腹痛、疲倦、厭食、類似感冒症狀、深色尿，須告知醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 若您正服用其它藥品，特別是抗凝血劑（如 warfarin），需告知醫師。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知醫師：
噁心嘔吐、食慾不振、手腳水腫、眼睛或皮膚變黃、胸悶胸痛、便秘、腹瀉、頭暈、熱潮紅、虛弱。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。