



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0047



蓖麻子[®]油

Castor oil



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

蓖麻子油[®] (Castor oil[®])

2008 02 修訂

藥品成分名：Castor oil

藥品外觀：黃色黏稠性之液體。

作用

增加腸蠕動與促進液體蓄積於大腸而產生緩瀉作用，緩解便秘；手術或檢查前淨腸。

用法

- 1.請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 2.空腹服用並喝大量開水。

注意事項

- 1.本藥不應長期使用，一旦排便順暢，即應停藥。
- 2.若有血便及自發性腸道出血狀況，應立即停藥就醫。
- 3.如廁時請小心以防跌倒、滑倒。

忘記服藥怎麼辦？

- 1.若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
- 2.若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形請不用驚慌：腸道過度活動如：腹絞痛、腹痛、噁心、嘔吐等。
2. 若上述症狀持續且有嚴重趨勢或有過敏反應，如虛弱、暈眩、心悸、劇烈絞痛、血便或肛門出血等，請立即停藥並就醫！

保存方法

1. 儲存於陰涼乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄，一般效期為開立期限後三個月內。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

預防藥物造成跌倒

- ★ 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌倒，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。
- ★ 預防方式：
 1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
 2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。