



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0118



暢寧®錠

Cetia® 10 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

暢寧[®]錠(Cetia[®] 10 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Cetirizine hydrochloride

藥品外觀：白色，長圓柱形，錠劑；大小：1.00 公分；標記：[S，T] [281]

作用

暢寧[®]錠為口服的抗過敏治療劑，用於治療過敏性或季節性鼻炎、蕁麻疹，過敏性搔癢、過敏性結膜炎等現象。

用法

1. 成人及三歲以上孩童適用。
2. 可於飯前或是飯後服用！
3. 每日服用一次的話，可於晚餐或睡前一次服用；或分別於早晚兩次服用一半劑量！

注意事項

1. 對中樞神經沒有作用，較不易產生安眠及行為異常等現象，但仍須小心使用，避免因嗜睡等現象而有跌倒情形發生。
2. 此藥會被排泄於乳汁中，授乳婦不可使用本藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

- 3.孕婦應避免使用本藥。
- 4.從事駕駛及操作機械者，請小心。
- 5.服用期間避免喝酒。

忘記服藥怎麼辦？

- 1.若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
- 2.若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
- 3.切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

- 1.可能引起短暫輕微的副作用，例如：頭痛、眩暈、嗜眠、口乾、胃腸不舒服。

保存方法

- 1.儲存於室溫乾燥處、避光保存。
- 2.避免放在孩童可以取得的場所。
- 3.若藥品超過保存期限請丟棄。
- 4.勿將您的藥物提供給他人使用。

服用過量怎麼辦？

★ 症狀：

單次服用超過五顆以上(包含 5 顆)，會有安眠的情形發生。

★ 處理方式：

1. 無特殊解毒劑。
2. 請儘速就醫進行灌腸及一般急救法處理。

