



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0049



可必安[®]錠
Clopran[®] 25 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

可必安[®]錠 (Clopran[®] 25 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Clomipramine

藥品外觀：白色雙凸錠劑，錠劑；大小：0.61 公分

作用

可必安[®]錠可用於治療情緒低落相關症狀之用藥。

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是青光眼，應告知您的醫師及藥師。
2. 對三環類抗憂鬱劑過敏者，不建議使用本藥。
3. 服藥期間請勿操作機器或開車。
4. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若發生癲癇發作、呼吸困難、發燒、盜汗、排尿困難、嚴重僵硬或蒼白、異常疲勞或身體衰弱，立即與您的醫師聯絡。

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。避免放在孩童可以取得的場所。
2. 若藥品超過保存期限請丟棄。
3. 勿將您的藥物提供給他人使用。