



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0043

可化凝[®]錠

Cofarin[®] 1 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

可化凝[®]錠 (Cofarin[®] 1 mg)

2010.05 修訂

藥品成分名：Warfarin

藥品外觀：粉紅色，扁平，錠劑；大小：1 公分；

標記：[GP][278]

作用

可化凝[®]錠是一種抗凝血劑，可以防止血栓形成，減少血管阻塞的危險。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 可於飯前或是飯後服用！
3. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次！

注意事項

1. 飲食習慣及運動量應盡量固定。
2. 維他命 K 會影響可化凝之療效，請不要突然大幅增、減食用含維他命 K 之食物，如：綠茶、醃燻豬肉、肝臟及綠色蔬菜。(參考下表)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 盡量避免或減少含酒精性飲料的攝取，若不確定其他藥品是否會與可化凝產生交互作用時，請告知醫師或藥師。
4. 服藥前，請確實告知醫師是否曾有出血問題（不正常瘀血或流鼻血現象或經期過長）、糖尿病、肝腎疾病、高血壓、癲癇、關節炎、甲狀腺機能異常、藥物過敏等問題。
5. 若已懷孕或計劃懷孕，請告知醫師。
6. 定期抽血監測凝血酶原時間(PT)或國際標準化凝血酶原時間比值(INR)。
7. 讓所有照顧您的醫療人員知道您正服用此藥。
8. 應盡量避免從事易引起外傷之危險活動
9. 避免割傷自己，小心使用牙刷或刮鬍刀，盡量選擇軟毛牙刷或電動刮鬍刀
10. 確定身邊有足夠藥量，並遵循醫師指示服藥
11. 請勿自行更換不同廠牌之藥品
12. 若不小心服用過量，請立即告知您的主治醫師或就近就醫
13. 若有不正常出血情形(如鼻出血、糞便顏色突然變深或刷牙有血絲等)，請立即告知您的主治醫師或就近就醫。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

每 100 克食物 維他命 K 含量之參考

很高 (>200mcg)	高 (100-200mcg)	中度 (50-100mcg)	低 (<50mcg)
綠花菜	九層塔	青蘋果	蘋果 馬鈴薯
碗豆/扁豆	硬花甘藍	蘆筍	酪梨 米(穀類)
萵苣	菜籽油	高麗菜	胡蘿蔔 蕃茄
肝臟	蝦夷蔥	花椰菜(白)	芹菜 玉米
荷蘭芹	洋蔥/青蔥	蛋黃醬	麥片
菠菜	帶皮黃瓜	堅果(開心果)	咖啡
紅茶	芥菜	南瓜	蛋
綠茶	大豆油		水果

*** 請隨身攜帶卡片或手圈註明您正使用此藥，以便意外發生時，醫療人員可以得知您的服藥現況**

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您