



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0050

康癲能[®]軟膠囊

Convulex[®] 500 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

康癲能[®]軟膠囊(Convulex[®] 500 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Valproic acid

藥品外觀：深紅橙色，長圓柱形，軟膠囊；
大小：2.1 公分；標記：[500]

作用

康癲能[®]錠為口服的抗癲癇製劑，主要治療各種癲癇發作，也可有效且快速治療躁鬱症患者的急性躁症。除此之外亦有預防偏頭痛的效用。

用法

1. 如有胃不適症狀，請與食物併服。
2. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
3. 在進行所有外科或牙科手術前應告知醫師你在正在服用 Convulex[®]。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：咳嗽、流鼻水、打噴嚏、疲倦。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、不正常出血、皮膚紅腫、癲癇控制不好。
3. 服用康癲能[®]錠可能導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。注意力易不集中容易跌倒請小心。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。