



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0051



可使保朗<sup>®</sup>膠囊  
Cospanon<sup>®</sup> 40mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 可使保朗<sup>®</sup>膠囊(Cospanon<sup>®</sup> 40mg)

藥品成分名：Flopropione

藥品外觀：深紅色，淡黃色，長圓柱形，硬膠囊；

大小：3 號；標記：[CS40][CS40]

## 作用

可使保朗<sup>®</sup>膠囊為解痙劑，用以解除膽道及胰臟炎所引發的痙攣與疼痛。

## 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

## 注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 老年人建議於謹慎監測下酌量降低服用的劑量。
3. 此藥物會產生頭痛暈眩症狀，患者避免從事需精神集中之工作，服用本藥治療期間，請小心行動，

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434 北醫附醫藥劑部 關心您

以避免發生跌倒意外造成危險。

### 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：噁心、嘔吐、心灼熱、腹部飽滿感。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

### 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。