



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0003



冠脂妥<sup>®</sup>膜衣錠  
**Crestor<sup>®</sup> 10 mg**



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 冠脂妥<sup>®</sup>膜衣錠(Crestor<sup>®</sup> 10 mg)

2010.11 修訂

藥品成分名：Rosuvastatin

藥品外觀：粉橘紅，圓形，錠劑；大小：0.7 公分；  
標記：[ZD4522/10]

## 作用

冠脂妥<sup>®</sup>膜衣錠用來降低血中過高的膽固醇，以減少心血管疾病、及中風的發作。

## 用法

依照醫師指示服藥

## 注意事項

如果有下列情形請先知會您的醫(藥)師：

1. 曾對本藥或類似藥物過敏
2. 正在懷孕或哺乳，因此藥會傷害胎兒，故在服藥期間需確實避孕。
3. 正在服用其他藥物或健康食品
4. 有肝腎疾病、肌肉無自主能力病史者，並須定期檢測肝功能。
5. 有飲酒習慣的人。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

6. 若您有正在服用下列的藥品，請告知您的醫師或藥師：

A. 抗生素：Azithromycin、Erythromycin、  
Clarithromycin(Klaricid)

B. 免疫抑制劑：Cyclosporine(Sandimmun  
Neoral)

C. 其他降血脂藥品：Gemfibrozil(GEMD)、  
Fenofibrate(Fenolip)。

### 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用兩份的藥量。

### 副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：頭痛、腹瀉、腹痛、嘔吐、胃腸脹氣、便秘，這些症狀會隨時間而慢慢減弱。
2. 若上述情況持續加重，或有下列情形發生，請立即與您的醫師聯絡：異常的肌肉疼痛、痙攣或不

尋常的虛弱感、眼睛或皮膚四周出現黃疸現象、  
下背部疼痛、皮膚過敏。

### 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

