



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0052



喜普<sup>®</sup>液

Cyproh<sup>®</sup> 0.4mg/ml



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 喜普<sup>®</sup>液 (Cyproh<sup>®</sup> 0.4mg/ml)

藥品成分名：**Cyproheptadine**

藥品外觀：瓶裝，淡黃橙色糖漿液。

## 作用

喜普<sup>®</sup>液是用以治療各種過敏症及搔癢症，如：過敏性鼻炎、皮膚炎、蕁麻疹及氣喘。

## 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

## 注意事項

1. 2. 對於青光眼、狹窄性胃潰瘍之患者及新生兒，請勿投與此藥物。
2. 此藥亦有促進食慾的效果。

3. 此藥物會產生頭痛、暈眩、思睡、有倦怠感之症狀，患者避免從事需精神集中之工作，並且慎防跌倒。
4. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：噁心嘔吐、凝血功能異常、頻尿、暈眩頭暈、發疹。
2. 當上述的症狀若持續且加重，請立即就醫！

### 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。

2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

