



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0053



得安緒[®]錠
Deanxit[®]



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

得安緒[®]錠 (Deanxit[®])

2008.02 修訂

藥品成分名：Flupentixol，Melitracen

藥品外觀：明紫色，圓凸形，錠劑；大小：0.7 公分

作用

得安緒[®]錠適應症為焦慮症、憂鬱症。可治療情緒低落、緩和焦慮相關症狀。

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳、或有心臟疾病、青光眼，應告知您的醫師及藥師。
2. 服用藥品應避免喝酒。
3. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，在治療劑量下極少有副作用發生，若有以下情形，請您不用過於擔心：偶有情緒不安和失眠狀況是暫時性。上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。