



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0054



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

祛喘[®]錠(Defen[®] 1 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Ketotifen

藥品外觀：紅/白色，長圓柱形，硬膠囊；大小：4號；標記：[PZP，09][PZP，09]

作用

祛喘[®]錠為口服的抗過敏及抗組織胺製劑，用於治療支氣管性氣喘、乾草熱引起之哮喘、嚴重反應性鼻炎、支氣管炎或皮膚反應。

用法

1. 每天二次，請於早晚飯後服用。
2. 對於藥物反應較為敏感之病人(嗜睡、鎮靜)，可採漸進方式服用。

注意事項

1. 孕婦宜小心使用。
2. 不宜突然停止本劑的治療，以免加劇氣喘狀況。
3. 本藥與安眠藥、鎮靜劑、抗組織胺製劑等併用，會增強藥效，應小心使用。

4. 由於藥物可能引起倦睡、鎮靜、暈眩或是定向感障礙的情形發生，應小心慎防跌倒，同時駕車或操作機械更應注意，避免產生意外。
5. 服用本藥期間，避免喝酒。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有鎮靜、倦睡、口渴、眩暈等情況發聲請您勿驚慌。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

可能增加跌倒的風險

服用此藥物可能會產生頭暈、嗜睡、視覺障礙等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。

