



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0055

帝拔癩<sup>®</sup>腸溶錠

Depakine<sup>®</sup> 200 mg



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 帝拔癲<sup>®</sup>腸溶錠( Depakine<sup>®</sup> 200 mg )

2008.02 修訂

藥品成分名：Valproate sodium

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：1.04 公分；  
標記：無

## 作用

帝拔癲<sup>®</sup>腸溶錠為口服的抗癲癇製劑，主要治療泛發性與局部性癲癇症、兒童抽搐或兒童熱性抽搐。

## 用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

## 注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
3. 長期使用，應定期檢查肝功能和血液血球數量

## 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。

2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥，不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：咳嗽、流鼻水、打噴嚏、疲倦。
2. 上述症狀若持續且加重，或有下列少見的情形，請立刻聯絡您的醫師：嚴重嘔吐、不正常出血、黃疸、皮膚紅腫、癲癇控制不好。
3. 服用帝拔癲<sup>®</sup>腸溶錠可能導致眩暈及嗜睡的副作用，服用時避免從事需要集中注意力的事如開車或操縱機械。注意力不易集中容易跌倒請小心。

### 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。