



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0026



癲能停[®]膠囊

Dilantin[®] 100 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

癲能停[®]膠囊 (Dilantin[®] 100 mg)

2011.01 修訂

藥品成分名：Phenytoin

藥品外觀：鮮紅橙/白色，長圓柱形，硬膠囊；大小：
3 號；標記：[PARKE，DAVIS][P-D，100]

作用

癲能停[®]膠囊是一種抗痙攣藥，可用於治療：

1. 控制癲癇或痙攣。
2. 治療周邊神經病變引起的疼痛，如：偏頭痛、三叉神經痛。
3. 治療心律不整。

用法

1. 癲能停[®]膠囊必須維持血中濃度以達最佳治療效果，請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 癲能停[®]膠囊請整粒吞服。
3. 制酸劑會影響癲能停[®]膠囊的藥效，請在服完癲能停[®]膠囊後 1 小時再服用制酸劑。
4. 管灌餵食的病人，請避免與食物一起以鼻胃管灌食，需間隔至少 2 小時。膠囊可打開直接以藥粉餵食，此藥易殘留於管壁上，建議灌完後以 10~30c.c.冷開水沖洗，避免藥粉黏附在管壁上。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

注意事項

1. 對癲能停[®]膠囊或其他抗癲癇藥物過敏，請勿使用此藥。
2. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、肝病、腎臟病及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
3. 按時回診，假如癲癇持續發作請與醫師聯繫。
4. 不要喝酒精性飲料，請勿自行服用未經醫師處方的藥品。
5. 癲能停[®]膠囊若造成腸胃不適，可和食物併服。但請每天以相同方法服藥，使藥物吸收穩定。
6. 癲能停[®]膠囊可能會讓您覺得頭暈，動作不協調、視線模糊、疲倦，在未確定此藥對您有何影響之前如需開車或操作危險機械，請務必特別注意。
7. 若需進行手術、拔牙，或其他緊急治療，請告知醫師正服用此藥。
8. 癲能停[®]膠囊可能降低口服避孕藥的效果，請採用其他避孕方式。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間(4小時以內)，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

症狀	如何處理
牙齦紅、腫、出血 (較易發生在年輕人)	做好口腔衛生(刷牙、使用牙線)、按摩牙齦、定期作口腔檢查,若症狀嚴重時請與醫師聯繫
噁心、嘔吐、便秘、胃痛、味覺異常、體重減輕、吞嚥困難	可隨餐服用或飲用大量水分,若症狀持續未改善,請與醫師聯繫
困倦、頭暈、頭痛、毛髮增生、失眠	若症狀持續或嚴重時,請與醫師聯繫
動作不協調、意識混亂、言語不清、視線模糊或複視、癲癇發作次數增加、肌肉抽搐、皮膚出現紫斑、不正常出血、呼吸困難、胸痛	若發生這些副作用時,請立即停藥並與醫師聯繫

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

此單張並不包含所有藥物資訊,如有任何疑問,請洽醫師或藥師。

諮詢電話:(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您