



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0007

樂可舒[®]腸溶糖衣錠

Dulcolax[®] 5 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

樂可舒[®]腸溶糖衣錠(Dulcolax[®] 5 mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Bisacodyl

藥品外觀：明黃色，圓凸形，錠劑；大小：0.60 公分；標記：無標記

作用

1. 便秘短期治療。
2. 在手術、生產或接受 X 光檢查前使用，以促進腸道的完全排空。

用法

1. 樂可舒[®]腸溶糖衣錠請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或頻次。
2. 樂可舒[®]腸溶糖衣錠通常在服用後 6~8 小時才會產生藥效。
3. 樂可舒[®]腸溶糖衣錠為特殊的膜衣錠，可減少對胃刺激，請整粒吞服，不要咬碎。
4. 服用制酸劑或牛奶後 1 小時內，請勿服用樂可舒[®]腸溶糖衣錠。
5. 因樂可舒[®]腸溶糖衣錠不可磨粉，若需以鼻胃管餵食，請告知醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

注意事項

1. 對樂可舒[®]腸溶糖衣錠過敏，請勿使用此藥。
2. 若您正懷孕、哺乳，或有胃痛、噁心、嘔吐、腸道蠕動功能急遽變化等情形，請先告知您的醫師。
3. 若您服用樂可舒[®]腸溶糖衣錠 1 星期後便秘情形沒有改善，請告知您的醫師。
4. 未經醫師指示，請不要將樂可舒[®]腸溶糖衣錠給小於 6 歲的兒童使用。
5. 為了幫助排便，每天至少喝 6~8 杯的水或果汁，多運動和吃高纖維的飲食。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用

症狀	如何處理
腸道過度活動(腹絞痛、腹瀉、打嗝、噁心)、 肛門周圍有刺激感	停藥，若症狀嚴重時， 請與醫師聯繫

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

過敏反應(虛弱、暈眩、心悸、出汗、脹氣及疑似過敏的臉部紅腫與不適)

停藥並請與醫師聯繫

保存方法

1. 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。
2. 請勿讓他人服用您的藥品。

