



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0059



癌德星[®]錠
Endoxan[®] 50mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

癌德星[®]錠(Endoxan[®] 50mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Cyclophosphamide

藥品外觀：白色，圓形雙凸錠劑；大小：0.8 公分

作用

癌德星[®]錠有抗癌及免疫調節的作用，可用於治療癌症、免疫力異常的疾病，或器官移植後減少器官排斥。

用法

按照醫生的指示時間服用。

注意事項

1. 服藥期間，請避免施打疫苗。
2. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知醫師：
噁心嘔吐、食慾不振、經期不正常、傷口不易癒合、發燒、皮膚起紅疹、落髮、尿液顏色變深。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。