



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0127



抑癌[®] 膠囊

Estracyt[®] 140mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

抑癌[®]膠囊 (Estracyt[®] 140mg)

2010.12 修訂

藥品成分名：Estramustine phosphate

藥品外觀：白色膠囊；標記：[ESTRACYT；KPh750]

作用

為一種治療攝護腺癌的藥品。

用法

此藥每天服用兩次，空腹使用，請依照醫師指示的時間服用。

注意事項

1. 若您對於此類藥物或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 若您有心血管疾病、糖尿病、腎功能或肝功能不良，請告知您的醫（藥）師。
3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受化療期間或化療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

所及預防感冒。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：
噁心及嘔吐、水腫、虛弱、疲倦、頭暈、禿髮、失眠、皮膚乾癢。這些症狀會隨時間慢慢減弱。
2. 若有下述症狀，請立刻通知您的醫師：嚴重腹瀉、手或腳紅腫、麻木或疼痛、發燒、寒顫、喉嚨痛、胸痛、發疹、食慾降低、嚴重嘔吐等。

保存方法

1. 此藥請密封，放在陰涼處避免日光照射。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

