



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0129



復乳納<sup>®</sup>膜衣錠  
**Femara<sup>®</sup> 2.5mg**



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 復乳納<sup>®</sup>膜衣錠 (Femara<sup>®</sup> 2.5mg)

2011.02 修訂

藥品成分名：Letrozole

藥品外觀：暗黃色，圓扁形，錠劑；大小：0.6 公分；  
標記：[FV][CG]。

## 作用

停經後之局部晚期或轉移性乳癌婦女患者之第一線治療用藥。

## 用法

1. 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 一般使用劑量：一天1錠2.5mg，一天1次，於固定時間服用。

## 注意事項

1. 有肝臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 本藥有可能造成骨質疏鬆或骨折，請在服藥期間注意一下骨質狀況，必要時可補充鈣質及維生素D。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 使用此藥品期間，請勿懷孕，並做好適當避孕措施。  
於哺乳期間也請勿使用此藥品。
4. 本藥品會造成疲勞和頭昏，若您有開車或操作機器時請注意。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，一陣子後會緩解，請不用擔心：熱潮紅、關節痛、噁心及疲勞。  
若上述症狀持續加重，請告知醫師。

### 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。

4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

