



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0012



祛脂<sup>®</sup>微粒膠囊  
**Fenolip<sup>®</sup> 200 mg**



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 祛脂<sup>®</sup>微粒膠囊(Fenolip<sup>®</sup> 200 mg)

2009.07 修訂

藥品成分名：Fenofibrate

藥品外觀：橘色，長圓柱形，硬膠囊；  
標記[CH51; CH51]

## 作用

祛脂<sup>®</sup>微粒膠囊用於降低血中三酸甘油脂(TG)、不好的膽固醇(LDL-C)以及增加好的膽固醇(HDL-C)血中濃度，以控制您的血脂接近正常值，並且可減少罹患冠狀動脈心臟疾病的機會。

## 用法

依照醫師指示。

## 注意事項

如果有下列情形請先知會您的醫(藥)師：

1. 若您對本藥或其它藥物有過敏。
2. 正在懷孕或哺乳，或計畫懷孕者。
3. 有肝腎方面疾病、甲狀腺疾病和有膽結石病史的病患。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

4. 正在服用其他藥物或健康食品，尤其是降血脂藥和抗凝血劑。
5. 不可自行停藥，按照醫生的指示，注意食物的攝取應該減少脂肪，適度運動。

### 忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 副作用

每一個藥都會有副作用，若您出現以下副作用，請勿驚慌：腸胃不適、腹瀉、脹氣、流鼻水、喉嚨痛，這些症狀會隨時間慢慢消失。

若上述症狀持續且加重，或有下列少見症狀，請立即聯絡您的醫(藥)師：肌肉疼痛或不尋常的虛弱感，皮膚或眼睛產生黃疸、尿液顏色變深、下背部疼痛、疹子、皮膚過敏。

## 保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

## 飲食原則：

攝取低膽固醇，低脂肪含量的食物。

### ★ 應多攝取：

蔬菜水果、脫脂牛奶、魚類、蛋白。

### ★ 應該避免攝取：

蛋黃、全脂牛奶、花生醬、巧克力、奶油、蛋糕、餅乾、椰子油、起士、洋芋片、棕欖油、以及油炸類食物。