



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0048

柔他益[®]持續性膜衣錠
Finska-LP[®] S.R.F.C. Tablets



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

康瑞斯持續性藥效錠

(Finska-LP[®] S.R.F.C. Tablet)

2008 02 修訂

藥品成分名：Loratadine 5 mg

Pseudoephedrine sulfate 120 mg

藥品外觀：白色圓形雙凸錠；大小：1.0 公分；標記：
[無特殊標記]。

作用

Loratadine 為一強效的第二代抗組織胺藥物。
Pseudoephedrine sulfate 為一天然麻黃素，對上呼吸道之充血黏膜具有收縮解充血作用。

康瑞斯[®]持續性藥效錠為複方產品，主要緩解過敏性鼻炎及感冒的相關症狀，如鼻塞、打噴嚏、流鼻水、搔癢及流眼淚。

用法

- 1.請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
- 2.請整顆吞服，不可剝半或嚼碎。

注意事項

- 1.若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。

2. 本藥品可能會有嗜睡、頭痛的副作用，使用後應避免開車及操作機械等危險動作。
3. Loratadine 會影響血糖與懷孕測試，也會使尿液變色。
4. 對於 14 天內服用 MAO 抑制劑病人及有狹角性青光眼、尿滯留、重度高血壓、重度冠狀動脈疾病之病人，應避免使用。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形請不用驚慌：嗜睡、疲倦、頭痛、神經過敏、口渴、失眠、心跳過速等。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：臉、唇或喉嚨水腫、原因不明的發燒、畏寒、心跳快速或不規則、呼吸困難或抽搐等，請立即停藥並就醫！

保存方法

1. 儲存於室溫(20~25°C)乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。

3. 若藥品超過保存期限請丟棄，一般效期為開立期限後三個月內。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

預防藥物造成跌倒

- ★ 使用抗組織氨藥物可能影響嗜睡、情緒、速度、注意力、警覺心、活動力等易造成跌倒等意外。
- ★ 預防方式：
 1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
 2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。