



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0130

護腺寧[®]錠

Fuprostate[®] 250mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

護腺寧[®]錠 (Fuprostate[®] 250mg)

2011.02 修訂

藥品成分名：Flutamide

藥品外觀：淡黃色，橢圓形，錠劑；大小：1.9 公分；
標記：[PBF 397]。

作用

抑制雄性激素吸收且抑制雄性激素作用，用於前列腺癌的輔助治療。

用法

1. 劑量及用法因人及因病情而異，請按醫囑指示用藥，勿自行增減藥量或任意停藥。
2. 一般使用劑量：一次250mg，一天3次，間隔8小時，於固定時間服用。

注意事項

1. 有肝臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 本藥會有可能造成貧血，使用期間請留意身體狀況。
3. 本藥會使皮膚對光敏感，若有嚴重的皮膚症狀出現

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

時，請盡快與醫師聯絡。

4. 本藥不可用於懷孕期間或哺乳期間，若要使用，請做好避孕。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，會逐漸緩和：
腹瀉、噁心嘔吐、失眠、疲倦。

若上述症狀加重，或有以下症狀，請盡快與醫師聯絡：
皮膚紅腫、潰爛，大水泡的發疹，表皮壞死，黃疸，嚴重肝臟問題。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。

3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

