



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0008

胃斯妥[®]持效膠囊

Gastro-Timelets[®] 30 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

胃斯妥[®]持效膠囊(Gastro-Timelets[®] 30mg)

2007.02 修訂

藥品成分名：Metoclopramide

藥品外觀：明黃橙/淡黃橙色，長圓柱形，硬膠囊；

大小：1 號；標記：無標記

作用

胃斯妥[®]持效膠囊可用於紓解噁心、嘔吐、胃灼熱、腹部疼痛、脹氣、食慾不振，和餐後持續的脹滿感等上腸胃道蠕動不良之症狀。

用法

1. 胃斯妥[®]持效膠囊請遵照醫師指示服藥。
2. 胃斯妥[®]持效膠囊一天服藥 1 次，飯前服用(飯前 30 分鐘)效果較好。
3. 胃斯妥[®]持效膠囊為長效劑型，應整粒吞服；以鼻胃管餵食的病人可以打開膠囊直接餵食，但請勿將膠囊內的顆粒磨碎。

注意事項

1. 對胃斯妥[®]持效膠囊過敏，請勿使用此藥。
2. 若患有癲癇、帕金森氏症、出血、腸阻塞疾病、腎上腺瘤等疾病，不適合使用胃斯妥[®]持效膠囊。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有高血壓、心、肝、腎、帕金森氏症、精神方面等疾病，及正服用其他藥物者，請先告知您的醫師。
4. 服用胃斯妥[®]持效膠囊期間請勿喝酒，酒精會加強昏睡效果。
5. 胃斯妥[®]持效膠囊可能會讓您覺得困倦，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。從事具潛在危險之活動(如開車、騎腳踏車、游泳等)應有人陪同。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用

症狀	如何處理
困倦、不安、便秘或腹瀉	若症狀持續或嚴重時，請與醫師聯繫
心跳異常，頭暈，四肢水腫，癲癇發作，嚴重肌肉僵直、手抖、痙攣，臉部、	請立即與醫師聯繫

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

眼睛、舌頭、頸部、頭部的不自主運動，呼吸困難	
------------------------	--

保存方法

1. 請儲存於室溫乾燥處、避光保存。避免放在孩童可以取得的場所。
2. 請勿讓他人服用您的藥品。

