



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0006

糖立清[®]錠

Gliclax SR[®] 30 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

糖立清錠 (Gliclax SR[®] 30 mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Gliclazide

藥品外觀：白色，長圓柱形，錠劑；大小：1.0 公分；
標記：[YSP 78]

作用

糖立清[®]錠為口服的抗糖尿病製劑，主要治療第 2 型糖尿病，以控制您的血糖接近正常值。

用法

1. 按照醫生的指示盡量保持在每日同一時間服用。
2. 可於飯前或是飯後服用！
3. 如果是每日服用一次的話，可於早晨一次服用；
如果是分成每日兩次服用的話，可於早晨和傍晚各服用一次！

注意事項

1. 若您有肝腎方面疾病、計畫或已懷孕、哺乳、心血管疾病、甲狀腺疾病、急性感染疾病，請立即告知您的醫生。並請定期監測血糖值。
2. 糖立清[®]錠可能增加您對光線的敏感性，請特別注意防曬，外出可戴帽或撐傘。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 請避免喝酒。
4. 配合醫生指示控制飲食和適量運動才能有效控制糖尿病症狀，有助於您的健康。
5. 有些藥物可能會影響糖立清[®]錠的血糖控制作用，因此若您有服用其他服用藥物請告知您的醫師或藥師。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有下列狀況請勿驚慌：腸胃不適、噁心、頭痛、缺乏食慾、體重改變。
2. 若症狀持續並無改善，或發生下列症狀請立即與您的醫師聯絡：高燒、失去意識、異常出血、喉嚨痛、皮膚潮紅或發癢起疹、眼睛或皮膚發生黃疸現象、尿液顏色變深。
3. 服用糖立清[®]錠可能造成低血糖症狀請小心(請見背面低血糖症狀處理方法)。

保存方法

1. 請儲存於緊密容器中，於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

發生低血糖該怎麼辦？

★ 症狀：顫抖、心跳加快、冒冷汗、注意力無法集中、異常飢餓、視力模糊、虛弱無力。

★ 處理方式：

1. 血糖值小於 70 mg/dl：立即服用 120-180 毫升果汁或糖果 8-10 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
2. 血糖值小於 50 mg/dl：立即服用 180-250 毫升果汁或糖果 10-15 顆；15-20 分鐘後測量血糖值。
3. 若症狀沒有改善，請立即與您的醫師聯絡。
4. 當低血糖症狀發生時請勿駕車，以免發生危險。

發生高血糖該怎麼辦？

★ 症狀：

例如異常口渴、疲倦、皮膚乾燥、呼吸困難、頻尿、沒胃口等。

★ 處理方式：

請測量血糖值並立即與您的醫師聯絡。