



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0065



基利克®錠

Glivec® 100mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

基利克®錠 (Glivec® 100mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：**Imatinib**

藥品外觀：深黃棕橘色，圓扁形，錠劑；大小：0.9公分；標記：[NVR][S，A]

作用

1. 此藥會干擾您體內癌細胞的生長，可用於治療癌症，如：骨髓性白血病。
2. 本藥亦可用於治療其他的疾病(如:胃腸基質瘤)，若需進一步資訊，可請教您的醫（藥）師。

服用指示

按照醫生的指示時間服用。

注意事項

1. 若您對於 Imatinib 或任何其他藥物過敏，請告知您的醫（藥）師。
2. 若您（曾）有肝臟疾病，請告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
4. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
5. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁

心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛、體重突然減輕或增加、頭暈、頭痛、失眠。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

