



# 臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0066

好度液<sup>®</sup>

**Haldol drops<sup>®</sup> 15 ml (2 mg/ml)**



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 好度液<sup>®</sup> (Haldol drops<sup>®</sup>)

2010.05 修訂

藥品成分名：Haloperidol

藥品外觀：15 ml (2 mg/ml)

## 作用

好度液<sup>®</sup>可用來調整精神狀態。

## 用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示服用或按照醫師的指示服用。

## 注意事項

1. 對本藥物過敏者禁止使用。
2. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病、巴金森氏症，應告知您的醫生及藥師。
3. 服用藥物可能造成眩暈、視力模糊，請避免操作機械及開車。
4. 服用此藥期間應避免喝酒。
5. 服用此藥初期、劑量有改變時，容易有眩暈、視力模糊，甚至肌肉僵硬、行動緩慢。請小心行動，

以避免發生跌倒意外造成危險。尤其是老年人，請特別注意。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，若有以下情形，請您不用過於擔心：噁心、嘔吐、便秘、口乾、眩暈、視力模糊。
2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：肌肉緊張異常、焦躁不安、或類似巴金森氏症狀：可能會肌肉僵硬、行動緩慢、手抖、流口水、大舌頭的情形，請立即就醫！

### 保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。

2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

