



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0068



愛治[®]膠囊

Hydrea[®] 500mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

愛治[®]膠囊 (Hydrea[®] 500mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Hydroxyurea

藥品外觀：淡綠/淺紅，長圓柱形，硬膠囊；

大小：00 號；標記：[BMS，303][BMS，303]

作用

為一種抗腫瘤藥物，能殺死癌細胞而用來治療癌症。

服用指示

按照醫生的指示時間服用。

注意事項

- 1.若您已知對此類藥物過敏或有骨髓、腎臟或貧血方面疾病，請先告訴您的醫師。
- 2.女性有懷孕或哺乳時請先主動告知您的醫師。愛治可能會傷害胎兒，因此若在接受治療期間或治療之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，治療期間請確實做好避孕措施。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成噁心嘔吐或食慾不振，以少量多餐的方式並且多漱口以加強口腔衛生。
2. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、發燒、噁心嘔吐、胃痛、腹瀉、便秘、虛弱、寒顫、喉嚨痛。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。