



# 臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0069

艾瑞莎<sup>®</sup>錠

Iressa<sup>®</sup> 250mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

# 艾瑞莎<sup>®</sup>錠 (Iressa<sup>®</sup> 250mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Gefitinib

藥品外觀：棕色，圓形，雙凸錠劑；

標記：[IRESSA 250]

## 作用

此藥可干擾您體內癌細胞的生長，用來治療癌症，  
如：非小細胞肺癌。

## 服用指示

1. 按照醫生的指示時間服用。
2. 通常每天一次，可空腹或與食物併用。

## 注意事項

1. 若您對於 Gefitinib 或任何其他藥物過敏，請告知您的醫(藥)師。
2. 若您目前有服用其他藥物，請告知您的醫(藥)師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 若您（曾）有肝臟疾病，請告知您的醫師。
4. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。
5. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
6. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請勿驚慌：腹瀉、皮疹、皮癢、皮膚乾燥及面皰。這些症狀通常發生於治療的第一個月，且通常隨時間會慢慢恢復，若症狀持續嚴重，請告知您的醫師。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 若有下述症狀，請立刻通知您的醫生：任何眼部症狀、嚴重或持續之腹瀉、噁心嘔吐、食慾不振、呼吸困難、咳嗽及發燒等。

## 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。