



臺北醫學大學附設醫院
TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0022

易適倍[®]錠
Isobide[®] 10 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

易適倍[®]錠 (Isobide[®] 10 mg)

2007.09 修訂

藥品成分名：Isosorbide dinitrate

藥品外觀：白色，圓形，錠劑；大小：1.0 公分；

標記：[WD][S, I]

作用

1. 心絞痛是因心肌缺氧所引起的胸痛，通常心絞痛的時間會小於 15 分鐘。
2. 易適倍[®]錠為有機硝酸鹽，具有血管擴張作用，可改善心臟的血氧供應量，但因口服後約 30 分鐘以上才產生藥效，因此只用於預防或緩解胸痛(心絞痛)，無法用於解除心絞痛的急性症狀。

用法

1. 請遵照醫師指示服藥，勿自行更改劑量或停藥。
2. 易適倍[®]錠請整粒吞服，空腹服用效果較好(飯前 1 小時或飯後 2 小時)。
3. 為避免產生耐藥性，易適倍[®]錠最後一次服藥時間與隔天早上服藥時間最好間隔 14 小時，如一天需服藥三次，建議給藥時間如下：7:00am、12:00am、5:00pm 或 9:00am、1:00pm、7:00pm。

注意事項

1. 對易適倍[®]錠或其他類似藥物(硝化甘油)過敏，請勿使用此藥。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

2. 易適倍[®]錠不可和威而鋼[®]併用
3. 懷孕或計畫懷孕、哺乳，有心血管疾病、腎臟病，及正服用其他藥物，尤其是心血管用藥者，請先告知您的醫師。
4. 易適倍[®]錠可能會讓您覺得頭暈，在未確定此藥對您有何影響之前請勿開車或操作危險機械。請避免快速坐下或起立，以免造成暈眩。
5. 請按時回診，讓醫師了解您的胸痛改善情形。
6. 請遵照醫師指示停止抽菸、喝酒。
7. 避免久站或激烈運動等可能會引起暈眩的活動。
8. 請勿未經醫師同意突然停用易適倍[®]錠，因為停用易適倍[®]錠需要慢慢降低劑量再停藥。

忘記服藥時該怎麼辦？

1. 想起時儘快服藥，但如果很接近下次服藥時間(2小時以內)，則跳過一次，照原來時間服用下一次的劑量。
2. 絕不可一次服用雙倍劑量。

可能的副作用

症狀	如何處理
頭痛	通常在服藥數天到數星期，頭痛症狀會消失，

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

	若持續頭痛，則詢問醫師是否可服用頭痛藥。未經醫師同意不可擅自服用頭痛藥或增減本藥之劑量
眼花、口乾、劇烈頭痛、皮疹	若症狀持續且嚴重時，立刻與醫師聯繫
過敏反應(臉和手水腫、口咽部水腫或刺痛、胸痛、呼吸困難)、嚴重暈眩、心跳減慢、嚴重胸痛、心悸、意識混淆、低燒、視覺模糊	若發生這些副作用，請立刻與醫師聯繫
嘴唇、指甲、掌心發紫，暈眩、呼吸困難、虛弱、心跳快速	此為劑量過量時的症狀。出現這些症狀時，立刻躺下或坐下，若症狀持續或昏倒時，請立刻送醫

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 請勿讓他人服用您的藥品。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您