



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0070



鬱思樂[®]膠囊
Ixel[®] 50 mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

鬱思樂[®]膠囊(Ixel[®] 50 mg)

2008.02 修訂

藥品成分名：Milnacipran

藥品外觀：粉紅/赭色，長圓柱形，硬膠囊；大小：3號；標記：[Ixel][50]

作用

鬱思樂[®]膠囊為口服抗重型憂鬱劑，改善情緒用藥。

用法

1. 盡量在每日同一時間服藥。
2. 請依藥袋指示或按照醫師的指示服用。

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或有腎、心臟疾病、青光眼、前列腺肥大，或者是其他生殖泌尿疾病，應告知您的醫師及藥師。
2. 已知對本藥產生過敏反應者不建議使用。
3. 服用本藥治療期間，請小心行動，以避免發生跌倒意外造成危險。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 每一種藥都有副作用，本藥的副作用多於治療的第一、二週發生，之後隨著症狀改善而逐漸減弱，若有以下情形，請您不用過於擔心：頭暈、出汗過多、焦慮、熱潮紅及小便困難等。
2. 較罕見的副作用為噁心、嘔吐、口乾、便秘、震顫、心悸和躁動。
3. 當上述的症狀若持續且加重，請與您的醫師聯絡。

保存方法

1. 本藥品貯放於室溫乾燥處，勿置於陽光直射處或車內，以免潮濕或高溫造成藥品變質。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。