



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0123



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

樂安[®]錠(L.A. TABLETS)

2011.01 修訂

藥品成分名：含 Phenytoin 50mg

Phenobarbital 20mg

藥品外觀：白色，圓扁形，錠劑；大小：0.82 公分；
標記：[特殊標記]

作用

控制癲癇或痙攣。

用法

1. 盡量保持在每日同一時間按照醫生的指示服用。
2. 建議於飯後服用

注意事項

1. 若您計畫（已）懷孕、哺乳，或者是有肝、腎、心臟疾病，應告知您的醫生及藥師。
2. 須定期看醫生檢查治療進度，若需調整劑量、停藥或改用其他藥物，須以遞減方式避免癲癇復發。
3. 若為老年人、有心臟疾患、肝腎功能不佳的患者，需謹慎評估後給予。
4. 會分泌至母乳中，因此不建議在治療期間哺乳。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

5. 酒精會增加此藥的鎮靜作用，盡可能避免。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 皮膚若出現皮疹，應先立即停藥。
2. 在中樞系統方面，可能發生暈眩、嗜睡、運動失調、注意力不集中等副作用。
3. 有時會發生食慾不振、噁心嘔吐等副作用。

保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

可能增加跌倒的風險

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8132 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

1. 服用此藥可能會產生暈眩、嗜睡、運動失調等副作用，可能增加患者跌倒的風險性，請多加注意。
2. 患者若癲癇發作時，也會增加跌倒風險。

