



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0058

樂可痢液[®]

Lacolyl[®] Solution



臺北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434
E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

樂可痢液[®] (Lacoly[®] Solution)

2010 05 修訂

藥品成分組成： Lactulose 667mg/ml

藥品外觀：棕色黏稠液體。

作用

用於緩解慢性便秘、或降低血中氨的濃度。

用法

1. 請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。
2. 治療劑量依個人情況而定，服用後 24 到 48 小時產生藥效。

注意事項

1. 假如您有糖尿病、懷孕、授乳、或正在服用其他藥物，須先告知您的醫生。
2. 便秘治療數天後沒有反應或再復發，應向醫師詢問。
3. 若使用於乳糖不耐症的患者，應考慮乳糖的含量。
4. 使用於治療便秘的劑量應通常不會對糖尿病患這形成問題。使用於肝昏迷的劑量較高，可能需要加以考量。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速補服。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 若發生腹痛、噁心、食慾不振或引起水瀉時應減量或停藥。
2. 若腹絞痛持續嚴重且有不尋常之腹瀉，請立即停藥並就醫。

保存方法

1. 儲存於陰涼乾燥處、避光保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄，一般效期為開立期限後三個月內。開封後可在室溫下保存 1 到 2 星期。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。

預防藥物造成跌倒

- ★ 使用緩瀉劑會增加病患如廁頻率，故在病患上下床間請攙扶以防跌倒，病患於如廁時應注意地板是否積水以防滑倒。

★ 預防方式：

1. 於如廁或上下樓梯時請緊握扶手站穩踏階以防跌倒受傷。
2. 盡量於光線良好、視線佳的地方活動，在活動範圍內請多留意障礙物以免絆倒摔跤。

