



臺北醫學大學附設醫院

TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0071



瘤克寧[®]錠

Leukeran[®] 2mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444

E-mail: pharmacy@mail.tmch.org.tw

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

瘤克寧[®]錠 (Leukeran[®] 2mg)

2009.12 修訂

藥品成分名：Chlorambucil

藥品外觀：深紅橙色，圓扁形，錠劑；

大小：0.60 公分；標記：[GXEG3，L]

作用

為一種抗腫瘤藥物。

服用指示

按您的醫師指示服用，因藥品易受食物影響，空腹(飯前1小時或飯後2小時)服用效果較好。

注意事項

1. 若您已知對此類藥物過敏或有癲癇或正在服用抗癲癇藥物，請先告訴您的醫師。
2. 女性有懷孕或哺乳應告訴您的醫師；本藥可能會傷害胎兒，若在接受治療期間或之後計畫懷孕，請向您的醫師做進一步的諮詢，必要時須避孕。

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

3. 若您有要施打任何疫苗（如：麻疹或流行感冒疫苗），請先告知您的醫師。
4. 治療期間，可能影響免疫力，請盡量避免出入公共場所及預防感冒。
5. 若您有服用以下藥物，如：阿斯匹靈、止痛劑、抗凝血劑、大蒜、人蔘、銀杏或維他命E等等，請在服用這些藥物前告知您的醫師。
6. 使用這個藥物後應定期回診追蹤檢查，並且將身體狀況告知您的醫師。

忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，請跳過這一次，到下次服藥時間再服用當次的藥。
3. 切記不可一次服用雙倍的藥量。

可能的副作用

1. 使用本藥後可能會造成噁心或嘔吐，以少量多餐的方式並且多漱口以加強口腔衛生。
2. 使用本藥後可能比較容易出血，所以必須小心避免受

此單張並不包含所有藥物資訊，如有任何疑問，請洽醫師或藥師。

諮詢電話：(02)27372181 轉 8130、8133 或 8444 北醫附醫藥劑部 關心您

傷；建議使用軟毛牙刷和電動刮鬍刀，以避免皮膚和牙齦出血。

3. 每一種藥物都有副作用，若有以下情況，請告知您的醫師：皮膚起紅疹、糞便或尿液顏色變深、肌肉痠痛、噁心嘔吐、食慾不振、胃痛、腹瀉、便秘、咳嗽、寒顫、喉嚨痛。

保存方法

1. 此藥需冷藏儲存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。