



# 臺北醫學大學附設醫院

## TAIPEI MEDICAL UNIVERSITY HOSPITAL

藥品使用指導單

0072

立舒定<sup>®</sup>錠

Lexotan<sup>®</sup> 1.5mg/3mg



台北醫學大學附設醫院藥劑部 關心您  
諮詢電話：(02)27372181 轉 8130 或 8434  
E-mail: [pharmacy@mail.tmch.org.tw](mailto:pharmacy@mail.tmch.org.tw)

# 立舒定<sup>®</sup>錠(Lexotan<sup>®</sup> 1.5mg/3mg)

藥品成分名：Bromazepam

藥品外觀：

## 1. Lexotan 1.5mg

白色圓形錠劑；一面刻 ROCHE/1.5；一面有一切橫

## 2. Lexotan 3mg

粉紅色圓形錠劑；一面刻 ROCHE/3；一面有一切橫

### 作用

是一種苯二酚(Benzodiazepine)類的藥物，低劑量用於解除焦慮、緩解緊張的情緒；高劑量用於鎮定、肌肉鬆弛。

### 用法

請確實遵照醫生或藥師的指示服用藥物。

### 注意事項

1. 請勿自行更改藥品服用劑量、頻次及天數，以避免不必要之副作用。
2. 若需要進行其他手術或牙科處置時，需告知醫生。

3. 使用此藥品前請勿吸煙、喝含酒精性的飲料及葡萄柚汁。
4. 使用此藥品後請勿開車或操縱精密的儀器，並小心走路預防可能發生的跌倒。
5. 在手術前需告訴醫生或藥師是否有其他並存的疾病(例如：中風、憂鬱症、心臟疾病、青光眼、肝腎疾病、肺部及呼吸道的疾病、怕金森氏症、癲癇、重症肌無力等等)。
6. 若有服用其他藥物(包括保健食品)請先告知醫生或藥師。
7. 若有計劃懷孕(或是已經懷孕)及哺乳婦女者，請先告知醫生。
8. 對苯二酚(Benzodiazepine)類過敏者須在使用前告知醫生。

### 忘記服藥怎麼辦？

1. 若您發現忘了服藥時，請盡速服藥。
2. 若已經很接近下一次服藥時間，只需服用下次藥物，不可一次服用雙倍的藥量。

### 可能的副作用

1. 服藥後若有以下情形，請您不用驚慌：嗜睡、暈眩、疲倦、頭痛、噁心、皮膚癢、情緒不穩、暫時性的失憶等；通常只會出現在治療初期，繼續

服用後通常症狀都會漸漸消失。

2. 當上述的症狀若持續且加重，或有下列少見的情形：憂鬱、睡眠障礙、激動、有攻擊性、心跳加快、眼睛變黃、講話困難、無法控制肌肉等，請立即就醫。

### 保存方法

1. 儲存於室溫乾燥處、避光、避熱保存。
2. 避免放在孩童可以取得的場所。
3. 若藥品超過保存期限請丟棄。
4. 勿將您的藥物提供給他人使用。